

## Нашите препоръки за оптимално снабдяване с хранителни вещества на вашите житни:

| За какво?   | Какво?  | Кога?          |  |                         |  |                             |  |
|---|---|----------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|
|   |   | ВВСН 00        | От 3-ти лист<br>ВВСН 13                | Братене<br>ВВСН 21 – 29 | Вретенене<br>до флагов<br>ВВСН 30 – 45 | Изкласяване<br>ВВСН 51 – 58 | До начало<br>на цъфтеж<br>ВВСН 59 – 61 |
| ✓ Третиране на семената с хранителни вещества за по-добро начално развитие            | <b>Авитар®</b>  | 2 – 5 л/тон    |  |                         |  |                             |  |
| ✓ По-добра ефективност и поносимост<br>✓ на почвените хербициди                       | <b>Хербозол®</b>  | 20 – 60 мл/дка |  |                         |  |                             |  |
| ✓ Подпомагане на началното развитие<br>✓ Енергиен и воден баланс<br>✓ Зимоустойчивост | <b>Лебозол®-ПК-Макс</b>                                 |                | 1 – 2 пъти 600 мл/дка                  |                         |  |                             |  |
| ✓ Намален стрес от суша<br>✓ Здраво и стабилно стъбло<br>✓ Устойчивост на стрес       | <b>Лебозол®-Силиций +<br/>Лебозол®-Бор</b>              |                | 2 – 3 пъти 50 – 100 мл/дка + 50 мл/дка |                         |  |                             |  |
| ✓ Устойчивост на измръзване<br>✓ Воден баланс<br>✓ Намален стрес от слънчева радиация | <b>Лебозол®-Манган 500 СК<br/>+Лебозол®-Цинк 700 СК</b> |                | 2 – 3 пъти 50 мл/дка + 50 мл/дка       |                         |  |                             |  |
| ✓ Здраво и стабилно стъбло<br>✓ Жизненост<br>✓ Ефикасно усвояване на азота            | <b>Лебозол®-Мед 350 СК</b>                              |                | 1 – 2 пъти 25 – 100 мл/дка             |                         |  |                             |  |
| ✓ Жизненост<br>✓ По-добра устойчивост на стрес<br>✓ Съдържание на протеин             | <b>ВИТАЛoСол® ГОЛД СК</b>                               |                | 1 – 3 пъти 200 – 500 мл/дка            |                         |  |                             |  |
| ✓ Подобен капацитет на фотосинтез<br>✓ Съдържание на протеин<br>✓ Добив на зърно      | <b>Лебозол®-МагС СК</b>                                 |                | 1 – 3 пъти 300 – 500 мл/дка            |                         |  |                             |  |

### Топ 3 най-използвани Лебозол®-продукти производство на житни:



#### ВИТАЛoСол® ГОЛД СК

От нашата ГОЛД серия:  
снабдяване с хранителни  
вещества и жизненост

##### Съдържание:

150 г/л Mn, 40 г/л Cu, 570 г/л S



#### Лебозол®-Манган 500 СК

Нашият еднокомпонентен тор за  
напълно торене с манган

**Съдържание:** 500 г/л Mn



#### Лебозол®-ПК-Макс

Най-добро снабдяване с  
фосфор и калий

##### Съдържание:

385 г/л P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 440 г/л K<sub>2</sub>O

